

Q3 患者さんから「指先がピリピリして文字が書きづらい」と訴えがありました。何が原因だと考えますか。

末梢神経障害

原因：オキサリプラチン ※前回のFOLFOX

投与後 1週間以内に生じることもあれば、
投与後 1か月以上経ってから現れることもある。

症状はしびれや感覚鈍麻・感覚過敏など多岐にわたる。

▲有効な予防法や治療法は確立されていない。

治療の中止や薬の減量は手段のひとつだが、
治療効果の減弱などのため慎重に行うべし。

血栓塞栓症

原因：イリノテカン

頻度不明ながら「重大な副作用」に挙げられる。

肺塞栓症や静脈塞栓症などで、
片側の手足の麻痺・しびれは初期症状のひとつ。

▲投与中止や抗血栓療法といった処置を行う。
ワルファリンや抗血小板の投与など。

EX1. FOLFILI か? FOLFOX か? 選択に関わる相違点

FOLFILI

「切除不能な進行再発大腸がん」の標準治療の筆頭。

- イリノテカンによる**脱毛が必発**.
とくに**女性患者**の社会生活への影響が大きい.
- 肝臓への副作用として**脂肪性肝炎 (NASHやCASH)**
長期投与で肝機能が低下.

参考

医科学出版社 ; 消化器癌治療の広場 ;

虎の巻 編集会議 ; 第2回 FOLFOX/FOLFILI の巻

<https://www.gi-cancer.net/gi/tora/kaigi02/p01.html>

FOLFOX

「切除不能な進行再発大腸がん」の標準治療の筆頭。

- オキサリプラチンによる**しびれの副作用が特徴**.
楽器奏者など、職業上おおきな問題になることも.
- 肝臓への副作用として**線維性肝変性 (blue liver)**
長期投与で肝機能が低下.
- 肝転移にも効果が高い. 肝切除不能などの症例に.
治療初期の副作用も少なく導入しやすい.
- 神経毒性が強まるほどに長く続けると
神経症状が回復しない. レジメンを切り替えても憎悪.