

PCG耐性*Streptococcus pneumoniae* の分離率（%）判定基準：PCG ≥0.125 µg/mL

施設/年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年
S-A	60.9	52.7	40.2	53.6	49.3	55.7	46.3	49.2	52.4	70.6	38.5	51.5	74.1
S-B	91.6	57.9	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D
S-C	51.9	63	49.1	58.3	52.5	45.7	54.3	50	31.6	56	50	66.7	55.6
S-D	56	47.8	13.6	45.5	29.4	52.9	50	23.5	30	60	16.7	0	0
S-E	29.4	29.4	55	0	27.8	26.7	36.4	36.8	75	44.4	0	28.6	11.1
S-F	56.7	47.7	77.8	54.5	65	65.5	60	50	80	12.5	62.5	50	50
S-P	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0	0	0
S-R	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	25	0
S-S	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	0
C-G	83.3	66.7	60.9	30.8	61	58.3	54.5	50	20	50	0	0	0
C-H	62.5	50.3	56	50.7	56.4	49.3	39.4	39.4	62.5	53.6	38.7	44.4	43.9
C-I	30.8	37.9	47.4	52.9	45.5	42.4	41.2	29.2	11.1	62.5	0	0	0
C-O	N.D	N.D	N.D	37.1	35.1	31.4	54.1	29.4	36	18.2	33.3	34.6	40
C-Q	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	N.D	50	70.6	54.5
N-J	57.1	58.3	43.9	47	46.4	40.7	46.8	41.5	51.4	73.9	44.1	47.6	38.9
N-K	56.4	64.4	50	60	47.2	56.7	55	58	46.2	60	53.6	62.2	37.8
N-L	N.D	N.D	56.3	66.7	58.6	50	35.7	42.9	40	68.8	83.3	50	50
N-M	56.4	45.9	57.1	45.8	40	46	47.1	46.2	37.8	42.1	48.4	12.9	2.9
N-N	54.2	50	47.2	45.2	48.1	52.6	78.6	71.4	54.5	50	42.9	40	42.9

地区/年	2012年	2013年	2014年	2015年	2016年	2017年	2018年	2019年	2020年	2021年	2022年	2023年	2024年
北地区	56.0	54.7	50.9	52.9	48.1	49.2	52.6	52.0	46.0	59.0	54.5	42.5	34.5
中地区	58.9	51.6	54.8	42.9	49.5	45.4	47.3	37.0	32.4	46.1	24.4	29.9	27.7
南地区	57.8	49.8	47.1	42.4	44.8	49.3	49.4	41.9	53.8	48.7	28.0	31.7	23.9
全体	57.5	51.7	50.3	46.3	47.3	48.1	50.0	44.1	44.9	51.6	35.1	34.4	27.9

N.D ; No data

計算式：PCG耐性*Streptococcus pneumoniae* の分離率（%）＝ PCG耐性*Streptococcus pneumoniae* の分離株数 / *Streptococcus pneumoniae* の分離株数